



Two-Way ANOVA without interaction

Ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες χωρίς αλληλεπίδραση

Ζιντζαράς Ηλίας, M.Sc., Ph.D.

Καθηγητής Βιομαθηματικών-Βιομετρίας
Εργαστήριο Βιομαθηματικών

Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

*Institute for Clinical Research and Health Policy Studies
Tufts University School of Medicine
Boston, MA, USA*

Θεόδωρος Μπρότσης, MSc, PhD
Εντεταλμένος Διδάσκων
(<http://biomath.med.uth.gr>)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: tmprotsis@uth.gr



Πότε;

- Όταν υπάρχουν δύο πιθανοί γνωστοί παράγοντες που συνεισφέρουν στη μεταβλητότητα (διακύμανση) των δεδομένων
- Τότε ο έλεγχος της επίδρασης του κάθε παράγοντα γίνεται με την ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (two-way ANOVA)
- Η ανάλυση γίνεται συνήθως με τη χρήση στατιστικού προγράμματος (SPSS, Excel)



Παράδειγμα

Σε ένα πείραμα για να συγκρίνουμε την επίδραση $k=3$ φαρμάκων στον αριθμό λεμφοκυττάρων σε ποντίκια, χρησιμοποιήθηκε ένας σχεδιασμός με 3 ποντίκια από $b=4$ διαφορετικά κλουβιά






Παράγοντες διακύμανσης

Υπάρχουν δύο πιθανοί παράγοντες διακύμανσης: το κλουβί και το φάρμακο

	Cages (κλουβιά)				
Drugs	1	2	3	4	Μέση τιμή
a	7.1	6.1	6.9	5.6	$\bar{x}_a = 6.43$
b	6.7	5.0	5.9	5.1	$\bar{x}_b = 5.68$
c	6.6	5.4	5.8	5.2	$\bar{x}_c = 5.75$

Συνολική μέση τιμή:

Η μέση τιμή όλων των τιμών είναι $\bar{\bar{x}} = 5.95$



Τι βλέπουμε με μία γρήγορη ματιά στις μέσες τιμές των γραμμών και σε σχέση με τη συνολική μέση τιμή;

Διακύμανση φαρμάκων

	Cages (κλουβιά)				
Drugs	1	2	3	4	Μέση τιμή
a	7.1	6.1	6.9	5.6	$\bar{x}_a = 6.43$
b	6.7	5.0	5.9	5.1	$\bar{x}_b = 5.68$
c	6.6	5.4	5.8	5.2	$\bar{x}_c = 5.75$
	$\bar{x}_1 = 6.80$	$\bar{x}_2 = 5.50$	$\bar{x}_3 = 6.20$	$\bar{x}_4 = 5.30$	$\bar{\bar{x}} = 5.95$

Διακύμανση κλουβιών



Διαχωρισμός αθροίσματος τετραγώνων

One Way Anova

SST

(total / overall)(sum of squares total)

SSC

(column / between / treatment)
sum of squares


SSE

(within / error)
sum of squares



Αθροίσματα τετραγώνων

Two-Way Anova





Υπολογισμός του συνολικού αθροίσματος τετραγώνων

A	B	C	D	E	F	
1	Cages (κλουβιά)					
2	Drugs	1	2	3	4	
3	a	7.1	6.1	6.9	5.6	6.425
4	b	6.7	5	5.9	5.1	5.675
5	c	6.6	5.4	5.8	5.2	5.75
6		6.8	5.5	6.2	5.3	5.95

5.870

=VAR.S(B3:E5)*(COUNT(B3:E5)-1)

Υπολογισμός του συνολικού SS

1. Βρίσκουμε τις διαφορές ανάμεσα σε κάθε τιμή και την συνολική μέση τιμή
2. Υψώνουμε στη δύναμη του 2 τις διαφορές
3. Αθροίζουμε



Υπολογισμός του αθροίσματος τετραγώνων των κλουβιών

		Cages (κλουβιά)				
1	A	B	C	D	E	F
2	Drugs	1	2	3	4	
3	a	7.1	6.1	6.9	5.6	6.425
4	b	6.7	5	5.9	5.1	5.675
5	c	6.6	5.4	5.8	5.2	5.75
6		6.8	5.5	6.2	5.3	5.95
7		=AVERAGE(B3:B5)	=AVERAGE(C3:C5)	=AVERAGE(D3:D5)	=AVERAGE(E3:E5)	
8						
9		0.850	-0.450	0.250	-0.650	
10		=B6-\$F6	=C6-\$F6	=D6-\$F6	=E6-\$F6	
11						
12		0.722	0.203	0.063	0.423	
13		=POWER(B9,2)	=POWER(C9,2)	=POWER(D9,2)	=POWER(E9,2)	
14						
15		4.230				
16		=SUM(B12:E12)*3				

Υπολογισμός SS κλουβιών

1. Βρίσκουμε τις διαφορές ανάμεσα στη μέση τιμή των κλουβιών και την συνολική μέση τιμή
2. Υψώνουμε στη δύναμη του 2 τις διαφορές
3. Αθροίζουμε
4. Πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των φαρμάκων



Υπολογισμός του αθροίσματος τετραγώνων των φαρμάκων

		Cages (κλουβιά)			
		1	2	3	4
Drugs	1	7.1	6.1	6.9	5.6
a	7.1	6.1	6.9	5.6	6.425
b	6.7	5	5.9	5.1	5.675
c	6.6	5.4	5.8	5.2	5.75
	6.8	5.5	6.2	5.3	5.95

1.365

=VAR.S(F3:F5)*2*4

Υπολογισμός SS Φαρμάκων

1. Βρίσκουμε τις διαφορές ανάμεσα στη μέση τιμή των φαρμάκων και την συνολική μέση τιμή
2. Υψώνουμε στη δύναμη του 2 τις διαφορές
3. Αθροίζουμε
4. Πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των κλουβιών



Άθροισμα τετραγώνων

$$\text{SS Συνολικό} = \text{SS Φάρμακα} + \boxed{\text{SS Κλουβιά} + \text{SSE}}$$

$$\text{SSE} = \text{SS Συνολικό} - \text{SS Κλουβιά} - \text{SS Φάρμακα}$$



Άθροισμα τετραγώνων

$$\text{SSE} = \text{SS Συνολικό} - \text{SS Κλουβιά} - \text{SS Φάρμακα}$$

$$\text{SSE} = 5.87 - 4.23 - 1.365$$

$$\text{SSE} = 0.275$$



Two-Way ANOVA χωρίς αλληλεπίδραση

Η two-way ANOVA παρουσιάζεται με τη μορφή του παρακάτω πίνακα:

Source of variation (Πηγή μεταβλητότητας)	df (Βαθμοί ελευθερίας)	SS (Sum of squares)
Between gaces	4-1=3	4.23
Between drugs	3-1=2	1.365
Error	11-3-2=6	0.275
Total	12-1=11 (N-1)	5.87

N = συνολικές παρατηρήσεις

Tests of Between-Subjects Effects					
	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	5.595 ^a	5	1.119	24.415	.001
Intercept	424.830	1	424.830	9269.018	.000
drugs	1.365	2	.683	14.891	.005
gaces	4.230	3	1.410	30.764	.000
Error	.275	6	.046		
Total	430.700	12			
Corrected Total	5.870	11			

a. R Squared = .953 (Adjusted R Squared = .914)



Two-Way ANOVA χωρίς αλληλεπίδραση

Μας ενδιαφέρει η σχέση ανάμεσα στη διακύμανση των φαρμάκων και στην διακύμανση του σφάλματος:

SS
Φαρμάκων

sum of square Φαρμάκων

SSE

sum of square error

df

MS
Φαρμάκων

mean square Φαρμάκων

MSE

mean square error



Two-Way ANOVA χωρίς αλληλεπίδραση

Μας ενδιαφέρει η σχέση ανάμεσα στη διακύμανση των φαρμάκων και στην διακύμανση του σφάλματος:

$$\begin{array}{c} \text{SS Φαρμάκων} \\ \hline \text{df Φαρμάκων} \\ \hline \text{SSE} \\ \hline \text{df Error} \end{array} = \begin{array}{c} 1.365 \\ \hline 2 \\ \hline 0.275 \\ \hline 6 \end{array} = \begin{array}{c} 0.6825 \\ \hline 0.04583 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{c} \text{MS} \\ \hline \text{Φαρμάκων} \\ \hline \text{MSE} \end{array}$$



Two-Way ANOVA χωρίς αλληλεπίδραση

Η two-way ANOVA παρουσιάζεται με τη μορφή του παρακάτω πίνακα:

Source of variation (Πηγή μεταβλητότητας)	df (Βαθμοί ελευθερίας)	SS (Sum of squares)	MS=SS/df (Mean Squares)	F=MS/Error MS
Between cages	4-1=3	4.23	1.41	
Between drugs	3-1=2	1.365	0.683	14.89
Error	11-3-2=6	0.275	0.046	
Total	12-1=11 (N-1)	1.83		

N = συνολικές παρατηρήσεις

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: cells					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	5.595 ^a	5	1.119	24.415	.001
Intercept	424.830	1	424.830	9269.018	.000
drugs	1.365	2	.683	14.891	.005
gaces	4.230	3	1.410	30.764	.000
Error	.275	6	.046		
Total	430.700	12			
Corrected Total	5.870	11			

a. R Squared = .953 (Adjusted R Squared = .914)



F-Test

- Ελέγχουμε αν τα φάρμακα διαφέρουν μεταξύ τους συγκρίνοντας την τιμή F =(Between drugs MS)/(Error MS)=14.89 με το 5% σημείο της F-κατανομής με 2 και 6 df (Between drugs df και Error df)
- Επειδή η τιμή του $F=14.89$ είναι μεγαλύτερη από τη τιμή της F-κατανομής που είναι 5.14 (δες Πίνακα της F-κατανομής στο τέλος) τότε υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των φαρμάκων με (πιθανότητα λάθους) $P<0.05$

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: cells					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	5.595 ^a	5	1.119	24.415	.001
Intercept	424.830	1	424.830	9269.018	.000
drugs	1.365	2	.683	14.891	.005
gaces	4.230	3	1.410	30.764	.000
Error	.275	6	.046		
Total	430.700	12			
Corrected Total	5.870	11			

a. R Squared = .953 (Adjusted R Squared = .914)

Εύρεση του 5% σημείου της F κατανομής για 2 και 6 df στο Excel

5.143



=F.INV.RT(0.05,2,6)



Excel Data Analysis

File -> Options -> Add Ins -> Go ... -> Analysis ToolPak

Data -> Data Analysis





Excel Data Analysis

Data -> Data Analysis

		Cages (κλουβιά)			
		1	2	3	4
Drugs	1	2	3	4	
a	7.1	6.1	6.9	5.6	
b	6.7	5	5.9	5.1	
c	6.6	5.4	5.8	5.2	

Anova: Two-Factor Without Replication

Input
Input Range: \$A\$2:\$E\$5
 Labels
Alpha: 0.05

Output options
 Output Range: \$A\$7
 New Worksheet Ply:
 New Workbook

OK Cancel Help

Detailed description: This image shows a Microsoft Excel spreadsheet and its corresponding 'Anova: Two-Factor Without Replication' dialog box. The spreadsheet contains a 5x5 data table with 'Drugs' on the rows and 'Cages' on the columns. The data values range from 5.1 to 7.1. The dialog box is open, showing the input range as \$A\$2:\$E\$5, with the 'Labels' checkbox selected. The alpha level is set to 0.05. The output options section has the 'Output Range' radio button selected, pointing to cell \$A\$7. Other options like 'New Worksheet Ply:' and 'New Workbook' are available but not selected.



Two-Way Anova

Source of variation (Πηγή μεταβλητότητας)	df (Βαθμοί ελευθερίας)	SS (Sum of squares)	MS=SS/df (Mean Squares)	F=MS/Error MS
Between gaces	4-1=3	4.23	1.41	
Between drugs	3-1=2	1.365	0.683	14.89
Error	11-3-2=6	0.275	0.046	
Total	12-1=11	1.83		

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: cells					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	5.595 ^a	5	1.119	24.415	.001
Intercept	424.830	1	424.830	9269.018	.000
drugs	1.365	2	.683	14.891	.005
gaces	4.230	3	1.410	30.764	.000
Error	.275	6	.046		
Total	430.700	12			
Corrected Total	5.870	11			

a. R Squared = .953 (Adjusted R Squared = .914)

20	ANOVA						
21	Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
22	Rows	1.365	2	0.6825	14.89090909	0.004714835	5.14325285
23	Columns	4.23	3	1.41	30.76363636	0.000486046	4.757062663
24	Error	0.275	6	0.045833333			
25							
26	Total	5.87	11				



two-way ANOVA with interaction

Ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες με αλληλεπίδραση

Ζιντζαράς Ηλίας, M.Sc., Ph.D.

Καθηγητής Βιομαθηματικών-Βιομετρίας
Εργαστήριο Βιομαθηματικών

Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

*Institute for Clinical Research and Health Policy Studies
Tufts University School of Medicine
Boston, MA, USA*

Θεόδωρος Μπρότσης, MSc, PhD Candidate
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
(<http://biomath.med.uth.gr>)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: tmprotsis@uth.gr



Two-Way Anova with interaction

- Όταν τα δεδομένα ταξινομούνται σε δύο παράγοντες
- Και υπάρχουν πολλαπλές παρατηρήσεις για κάθε συνδυασμό των δύο παραγόντων (replication)
- Τότε, ο έλεγχος της επίδρασης του κάθε παράγοντα (δηλ. της διαφοράς μεταξύ των επιπέδων του παράγοντα) ή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων γίνεται με την ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (two-way ANOVA with replication) με αλληλεπίδραση.



Παράδειγμα

Για να ερευνήσουμε την επίδραση του σορβικού οξέος (sa) και του pH του νερού στην επιβίωση της σαλμονέλας, χρησιμοποιήσαμε

- $w=3$ επίπεδα pH (5.0, 5.5, 6.0) και
- $s=2$ επίπεδα σορβικού οξέος (0, 100 p.p.m.).

Για τον κάθε συνδυασμό sa και pH υπάρχουν $k=3$ παρατηρήσεις.

Μία εβδομάδα μετά μετρήθηκε η ποσότητα σαλμονέλας που επιβίωσε ($\log(\piυκνότητα/ml)$).



Two-Way Anova with interaction

		ph		
sa		6.0	5.5	5.0
0	6.0	8.2	5.9	4.3
	5.5	8.4	6.0	4.3
	5.0	8.3	6.1	4.2
100	6.0	7.6	5.0	4.1
	5.5	7.8	5.3	4.4
	5.0	7.6	5.8	4.2



Two-Way Anova with interaction

		ph			
sa		6.0	5.5	5.0	Μέση τιμή
0		$\bar{x}_{6.0,0} = 8.3$	$\bar{x}_{5.5,0} = 6.0$	$\bar{x}_{5.0,0} = 4.27$	$\bar{x}_0 = 6.19$
100		$\bar{x}_{6.0,100} = 7.67$	$\bar{x}_{5.5,100} = 5.37$	$\bar{x}_{5.0,100} = 4.23$	$\bar{x}_{100} = 5.76$
		$\bar{x}_{6.0} = 7.99$	$\bar{x}_{5.5} = 5.69$	$\bar{x}_{6.0} = 4.25$	$\bar{\bar{x}} = 5.98$

Κάθε κυψέλη (cell) έχει τη δική της κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση).




Two-Way Anova with interaction

		ph			
sa		6.0	5.5	5.0	Μέση τιμή
0		$\bar{x}_{6.0,0} = 8.3$ 	$\bar{x}_{5.5,0} = 6.0$ 	$\bar{x}_{5.0,0} = 4.27$ 	$\bar{x}_0 = 6.19$
100		$\bar{x}_{6.0,100} = 7.67$ 	$\bar{x}_{5.5,100} = 5.37$ 	$\bar{x}_{5.0,100} = 4.23$ 	$\bar{x}_{100} = 5.76$
		$\bar{x}_{6.0} = 7.99$	$\bar{x}_{5.5} = 5.69$	$\bar{x}_{6.0} = 4.25$	$\bar{x} = 5.98$



Estimated Marginal Means




- Για επίπεδο ρh 5.5 και 6.0 παρατηρούμε πως έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα σαλμονέλας που επιβίωσε στο επίπεδο 0 του sa
- Για το επίπεδο όμως ρhp 5.0 παρατηρούμε πως δεν έχουμε διαφορά στην ποσότητα σαλμονέλας που επιβίωση για τα δύο επίπεδα του sa

Τα δύο επίπεδα του sa αυξάνουν σταθερά την επιβίωση της σαλμονέλας σε όλα τα επίπεδα του ρh;



Estimated Marginal Means



Η απάντηση είναι: ΌΧΙ

Αυτό το είδος της κατάστασης ονομάζεται
αλληλεπίδραση

Η ύπαρξη της αλληλεπίδρασης σημαίνει
ότι η διαφορά (D) $sa0-sa100$ δεν είναι
σταθερή

**Αλληλεπίδραση σημαίνει επίσης ότι οι
διαφορές (D) διαφέρουν μεταξύ τους**

Σε ένα marginal means γράφημα, σαν
γενικό κανόνα, κοιτάμε να δούμε αν οι
γραμμές ενώνονται ή τείνουν να
ενωθούν, οπότε υπάρχει αλληλεπίδραση
στατιστικά σημαντική



Two-Way Anova with interaction

H ANOVA παρουσιάζεται με τον εξής πίνακα:

Source of variation	df	SS	MS=SS/df	F=MS / s ²
pH	w-1=2	42.46	21.23	590
Sa	s-1=1	0.86	0.86	23.89
Interaction pH*sa	(w-1) * (s-1)=2	0.34	0.17	4.72
Error (Residual)	17-2-1-2=12	0.43	s ² =0.036	
Total n=18-1=17				

$$3.885293835$$

=F.INV.RT(0.05, 2, 12)

- Ελέγχουμε αν τα επίπεδα pH διαφέρουν συγκρίνοντας την τιμή $F = (pH \ MS)/(Residual \ MS) = 590$ με το 5% σημείο της F – κατανομής με 2 και 12 df (pH df και Residual df) που είναι 3.89 (δες πίνακα F-κατανομής στο τέλος)
- Επειδή η τιμή της $F = 590$ είναι πολύ μεγαλύτερη από το 3.89, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων pH ($P < 0.05$)



Two-Way Anova with interaction

H ANOVA παρουσιάζεται με τον εξής πίνακα:

Source of variation	df	SS	MS=SS/df	F=MS / s ²
pH	w-1=2	42.46	21.23	590
Sa	s-1=1	0.86	0.86	23.89
Interaction pH*sa	(w-1) * (s-1)=2	0.34	0.17	4.72
Error (Residual)	17-2-1-2=12	0.43	s ² =0.036	
Total n=18-1=17				

4.747225347
=F.INV.RT(0.05, 1, 12)

- Ελέγχουμε αν τα επίπεδα σα διαφέρουν συγκρίνοντας την τιμή $F = (sa \text{ MS})/(Residual \text{ MS}) = 23.89$ με το 5% σημείο της F – κατανομής με 1 και 12 df (sa df και Residual df) που είναι 4.75 (δες πίνακα F-κατανομής στο τέλος)
- Επειδή η τιμή της $F = 23.89$ είναι μεγαλύτερη από το 4.75, υπάρχει διαφορά μεταξύ των επιπέδων sa ($P < 0.05$)



Two-Way Anova with interaction

Η ANOVA παρουσιάζεται με τον εξής πίνακα:

Source of variation	df	SS	MS=SS/df	F=MS / s ²
pH	w-1=2	42.46	21.23	590
Sa	s-1=1	0.86	0.86	23.89
Interaction pH*sa	(w-1) * (s-1)=2	0.34	0.17	4.72
Error (Residual)	17-2-1-2=12	0.43	s ² =0.036	
Total n=18-1=17				

$$3.885293835$$

=F.INV.RT(0.05, 2, 12)

- Ελέγχουμε αν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ pH και sa συγκρίνοντας την τιμή $F = (Interaction\ MS)/(Residual\ MS) = 4.72$ με το 5% σημείο της F – κατανομής με 2 και 12 df (Interaction df και Residual df) που είναι 3.89 (δες Πίνακα F-κατανομής στο τέλος)
- Επειδή η τιμή της $F = 4.72$ είναι μεγαλύτερη από το 3.89, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ pH και sa ($P<0.05$)




Two-Way Anova with interaction

- Μπορούμε να κάνουμε σύγκριση των μέσων τιμών δύο επιπέδων pH ή δύο επιπέδων sa χρησιμοποιώντας το T-Test (όπως και στην one-way ANOVA)
- Επίσης, μπορούμε να κάνουμε σύγκριση των μέσων τιμών δύο επιπέδων pH για ένα επίπεδο του sa χρησιμοποιώντας πάλι το T-Test (όπως και στην one-way ANOVA)



Excel

Data -> Data Analysis





Excel

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: salmonel					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	43.769 ^a	5	8.754	235.179	.000
Intercept	642.014	1	642.014	17248.134	.000
sa	.845	1	.845	22.701	.000
ph	42.564	2	21.282	571.761	.000
sa * ph	.360	2	.180	4.836	.029
Error	.447	12	.037		
Total	686.230	18			
Corrected Total	44.216	17			

a. R Squared = .990 (Adjusted R Squared = .986)

32	ANOVA							
33	Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit	
34	Sample	0.845	1	0.845	22.70149	0.000460488	4.747225	
35	Columns	42.56444444	2	21.28222222	571.7612	1.25435E-12	3.885294	
36	Interaction	0.36	2	0.18	4.835821	0.028822828	3.885294	
37	Within	0.446666667	12	0.03722222				
38								
39	Total	44.21611111	17					

F-Distribution

Degrees of freedom in denominator	Degrees of freedom in numerator												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	40	∞
1	161.40	199.50	215.70	224.60	230.20	234.00	236.80	238.90	240.50	241.90	248.00	251.10	254.30
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.45	19.47	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.66	8.59	8.50
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.80	5.72	5.60
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.56	4.46	4.40
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	3.87	3.77	3.70
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.44	3.34	3.20
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.15	3.04	2.90
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	2.94	2.83	2.70
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.77	2.66	2.50
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.65	2.53	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.54	2.43	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.46	2.34	2.20
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.39	2.27	2.10
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.33	2.20	2.10
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.28	2.15	2.00
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.23	2.10	2.00
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.19	2.06	1.90
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.16	2.03	1.90
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.12	1.99	1.80
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	1.93	1.79	1.60
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	1.84	1.69	1.50
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.66	1.50	1.30
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.57	1.39	1.00