

Συστηματικές Ανασκοπήσεις στην Κλινική Ιατρική

Από το κλινικό ερώτημα στη σύνθεση της τεκμηρίωσης

EBM & SR

Γιατί χρειαζόμαστε συστηματικές ανασκοπήσεις;

- Υπερβολικός όγκος βιβλιογραφίας
- Αντικρουόμενες μελέτες
- Κίνδυνος bias
- Μία μόνο μελέτη συνήθως δεν αρκεί

EBM & SR

Narrative Review vs Systematic Review

Narrative review:

- Επιλεκτική βιβλιογραφία
- Υποκειμενικότητα

Systematic review:

- Προκαθορισμένο πρωτόκολλο
- Διαφάνεια
- Αναπαραγωγικότητα

EBM & SR

Τα 7 βασικά βήματα

1. Κλινικό ερώτημα
2. Πρωτόκολλο
3. Αναζήτηση βιβλιογραφίας
4. Screening μελετών
5. Data extraction
6. Risk of bias assessment
7. Σύνθεση δεδομένων

EBM & SR

Το πλαίσιο PICO

P = Population

I = Intervention

C = Comparator

O = Outcome

EBM & SR

Στρατηγική αναζήτησης

- Keywords
- MeSH terms
- Boolean operators
- Πολλαπλές βάσεις δεδομένων

EBM & SR

Boolean operators

AND → πιο περιορισμένη αναζήτηση

OR → πιο ευρεία αναζήτηση

NOT → αποκλεισμός όρων

Παράδειγμα:

(cancer OR neoplasm) AND immunotherapy

EBM & SR


PRISMA Flow Diagram

Identification → Screening → Eligibility → Included Studies

Το PRISMA είναι το audit trail της ανασκόπησης.

EBM & SR

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases and registers only



*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched (rather than the total number across all databases/registers).

**If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools.

Πρωτόκολλο ανασκόπησης

EBM & SR

1. Κριτήρια Αναζήτησης.
2. Επιλεγμένες βάσεις αναζήτησης.
3. Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των μελετών
4. Εργαλεία αξιολογησης της ποιότητας των μελετών που βρέθηκαν
5. Μέθοδοι καταγραφής των δεδομένων κάθε μελέτη
6. Ποσοτική σύνθεσ αυτών (μετα-ανάλυση)

Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

EBM & SR

Παραδείγματα inclusion criteria:

- Ενήλικες
- RCTs
- Human studies

Exclusion criteria:

- Animal studies
- Case reports
- Abstract-only papers

EBM & SR

- Population

- Intervention

BMI: (Obese)													
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Study Location	Final N	Sex	Race/Ethnicity	Age Group	Type of Juice	Factors Controlled (or Adjusted) For	Diet Intake Measured Using:	National Sample?	Diet Intake Measured By:	BMI Outcomes	Ponderal Index Outcomes	BMI Z-score Outcomes	Fat Mass Outcomes
Canada	10,038	Both	NR	Two to 18 years	NR	Sex, age, race/ethnicity, SES, total EI, PA/sedentary behavior	24-hour Food Recall	Yes	Self-report	BMI: NS			
Ontario, New York (rural)	149	NR	White, Other	Two- and five-year-olds	NR	Sex, Age	Seven 24-hour Dietary Recalls; One Seven-Day Diet Record	No	Self-report	BMI 75 th percentile: NS, BMI 90 th percentile	Ponderal Index (two years, five years)		
Cherokee County, rural Ontario, New York	163	Both	White	Two- and five-year-olds	Apple, grape and "other" 100% fruit juice	Sex, total EI, maternal height	Seven 24-hour Dietary Recalls; One Seven-Day Diet Record	No	Self-report, researcher interview (researcher directed) interview (researcher directed)	BMI (apple juice) ^{UP}	Ponderal Index (apple juice)		
USA	73	Both	White, Black, Hispanic, Other	Preschool (two to five years)	NR	Sex, race/ethnicity, SES, total EI, PA/sedentary behavior	24-hour Food Recall	Yes	Self-report (researcher directed)	BMI: NS			
Verzaitenang Guatemala	356	Both	NR	Elementary school age (six to 12 years)	NR	Sex, SES	24-hour Food Recall	No	Self-report	BMI: (Obese)			
NYC, NY	526	Both	White, Black, Hispanic, Asian	Preschool (two to five years)	NR	None	NR	No	Self-report	BMI: NS			
United States	2,061	Both	White, Black, Hispanic, Asian	(two to five years), elementary school age	NR	Sex, race/ethnicity, total EI	Multi-pass Method	Yes	Researcher interview (researcher directed)	BMI: NS		BMI Z-score: NS	Fat Mass: NS
United States	1,572	Both	White, Black, Hispanic, Asian	Preschool (two to five years)	NR	Sex, age, race/ethnicity, SES, total EI, PA/sedentary behavior	24-hour Food Recall	Yes	Researcher interview (researcher directed)	BMI: NS			
United States	215	Both	White, Black, Hispanic	(12 to 14 years), teen (13 to 18 years)	NR	Sex, race/ethnicity, total EI	Multi-pass Method	Yes	Researcher interview (researcher directed)	BMI: NS		BMI Z-score: NS	
United States	2,183	NR	White, Black, Hispanic, Asian	(two to five years), elementary school age	Orange	Sex, age, race/ethnicity, total EI, PA/sedentary behavior, BMI for non-BMI mode	Multi-pass Method	Yes	Researcher interview (researcher directed)	BMI: NS			Fat Mass: NS

Γιατί το data extraction είναι δύσκολο;

- Missing data
- Ασαφής αναφορά αποτελεσμάτων
- Διαφορετικοί ορισμοί outcomes
- Inconsistent reporting

EBM & SR

Γιατί το Bias έχει σημασία

EBM & SR

Το bias μπορεί να αλλοιώσει συστηματικά τα αποτελέσματα μιας μελέτης.

Μία biased μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο συμπέρασμα με μεγάλη «βεβαιότητα».

Selection Bias

Προκύπτει όταν οι ομάδες διαφέρουν ήδη από την αρχή.

Παραδείγματα:

- Κακή randomization
- Ανεπαρκές allocation concealment
- Μη συγκρίσιμοι πληθυσμοί

EBM & SR

Performance Bias

Προκύπτει όταν οι ομάδες λαμβάνουν διαφορετική φροντίδα πέρα από την intervention.

Παραδείγματα:

- Έλλειψη blinding
- Διαφορετικά co-interventions

EBM & SR

Detection Bias

Προκύπτει όταν η αξιολόγηση των outcomes διαφέρει μεταξύ των ομάδων.

Παράδειγμα:

Ο assessor γνωρίζει ποιος έλαβε τη θεραπεία.

EBM & SR

Attrition Bias

Προκύπτει όταν υπάρχει διαφορετική απώλεια παρακολούθησης.

Σημαντικό ερώτημα:
Ποιοι ασθενείς «χάθηκαν» και γιατί;

EBM & SR

Selective Reporting Bias

Όταν δημοσιεύονται μόνο τα «θετικά» outcomes.

Παραδείγματα:

- Outcome switching
- Παράλειψη αρνητικών αποτελεσμάτων

EBM & SR

Publication Bias

Οι θετικές μελέτες δημοσιεύονται συχνότερα.

Αποτέλεσμα:

Η βιβλιογραφία μπορεί να υπερεκτιμά το όφελος.

EBM & SR

Risk of Bias Tools – Γιατί τα χρειαζόμαστε;

Τα risk-of-bias tools βοηθούν στην αξιολόγηση της εσωτερικής εγκυρότητας μιας μελέτης.

Στόχος:

Να εκτιμηθεί εάν τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν παραμορφωθεί από systematic errors.

EBM & SR

Traffic-Light Visualization in RoB 2

-  Low risk of bias
-  Some concerns
-  High risk of bias

Συχνά παρουσιάζεται σε heatmaps ή summary figures.

**SR
TOOLS**

Cochrane RoB 2 Tool

Χρησιμοποιείται κυρίως για Randomized Controlled Trials (RCTs).

EBM & SR

Αξιολογεί:

- Randomization process
- Deviations from intended interventions
- Missing outcome data
- Outcome measurement
- Selective reporting

Cochrane RoB 2 Tool

EBM & SR

		Risk of bias domains					
		D1	D2	D3	D4	D5	Overall
Study	Study 1						
	Study 2						
	Study 3						
	Study 4						
	Study 5						
	Study 6						
	Study 7						
	Study 8						
	Study 9						

Domains:

D1: Bias due to randomisation.

D2: Bias due to deviations from intended intervention.

D3: Bias due to missing data.

D4: Bias due to outcome measurement.

D5: Bias due to selection of reported result.

Judgement

High

Some concerns

Low

ROBINS-I

Risk Of Bias In Non-randomized Studies - of Interventions

Χρησιμοποιείται για observational studies.

Πιο δύσκολο στην εφαρμογή λόγω confounding.

EBM & SR

Newcastle-Ottawa Scale (NOS)

Συχνά χρησιμοποιείται για cohort και case-control studies.

Domains:

- Selection
- Comparability
- Outcome/Exposure

Βασίζεται σε σύστημα «αστεριών».

EBM & SR

QUADAS-2

Εργαλείο για diagnostic accuracy studies.

EBM & SR

Domains:

- Patient selection
- Index test
- Reference standard
- Flow and timing

	Risk of Bias				Applicability Concerns		
	Patient Selection	Index Test	Reference Standard	Flow and Timing	Patient Selection	Index Test	Reference Standard
Chen2021	?	+	?	+	?	+	+
Matsuzawa2021	?	-	?	+	+	+	+
Rao2022	?	?	?	+	+	+	+
Souza2018	?	?	+	+	+	+	+
Wilkinson2021	?	?	?	+	+	+	+

+

 Low

?

 Unclear

-

AMSTAR 2

Χρησιμοποιείται για αξιολόγηση systematic reviews.

Εξετάζει:

- Protocol registration
- Search strategy
- Risk of bias methods
- Publication bias
- Meta-analysis methods

EBM & SR

PROSPERO – Τι είναι;

International prospective register of systematic reviews.

<https://www.crd.york.ac.uk/prospero/>

Χρησιμοποιείται για προεγγραφή πρωτοκόλλων systematic reviews.

EBM & SR

Γιατί γίνεται καταγραφή στο PROSPERO;

- Διαφάνεια
- Μείωση selective reporting
- Αποφυγή duplication
- Βελτίωση methodological rigor

Επιτρέπει σύγκριση protocol vs final publication.

EBM & SR

Τι περιλαμβάνει ένα PROSPERO registration;

- Review question
- PICO
- Eligibility criteria
- Databases
- Outcomes
- Risk-of-bias methods
- Planned analysis

EBM & SR

Πότε πρέπει να γίνεται η καταγραφή;

Ιδανικά:

ΠΡΙΝ ξεκινήσει το screening ή data extraction.

Αν το review έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά,
μπορεί να απορριφθεί από το PROSPERO.

EBM & SR

Κρίσιμο μήνυμα

Μία systematic review ΔΕΝ είναι αυτόματα υψηλής ποιότητας.

Garbage in → garbage out.

EBM & SR

Heterogeneity

- Clinical heterogeneity
- Methodological heterogeneity
- Statistical heterogeneity

EBM & SR

Γιατί δεν κάνουμε πάντα meta-analysis;

Δεν μπορούν όλες οι μελέτες να συνδυαστούν.

EBM & SR

Διαφορετικοί πληθυσμοί, outcomes και methods μπορεί να κάνουν τη σύνθεση παραπλανητική.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Systematic Reviews

Η ΑΙ μπορεί να επιταχύνει τις systematic reviews, αλλά δεν αντικαθιστά την επιστημονική κρίση.

EBM & SR

Πού βοηθά η AI;

- Literature searching
- Screening abstracts
- Duplicate detection
- Data extraction
- Drafting tables
- Workflow organization

EBM & SR

AI εργαλεία για searching

- Semantic Scholar
- Elicit
- ResearchRabbit
- Connected Papers

Χρήσιμα για discovery και citation mapping.

EBM & SR

AI εργαλεία για screening

- Rayyan
- ASReview
- Covidence

Machine learning-assisted prioritization of studies.

EBM & SR

AI εργαλεία για data extraction

- RobotReviewer
- DistillerSR
- GPT-based systems

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαιτείται πάντα manual verification.

EBM & SR

Πλεονεκτήματα της AI

- Ταχύτητα
- Scalability
- Better organization
- Living systematic reviews
- Reduced repetitive workload

EBM & SR

Περιορισμοί και κίνδυνοι της AI

- Hallucinations
- Citation errors
- Missing key studies
- Inaccurate extraction
- Overtrust by users

EBM & SR

Ηθικά ζητήματα

- Διαφάνεια στη χρήση AI
- Reproducibility
- Accountability
- Authorship concerns

EBM & SR

Πρακτική συμβουλή προς φοιτητές

Χρησιμοποιήστε AI:

- ✓ για υποστήριξη
- ✓ για οργάνωση
- ✓ για επιτάχυνση repetitive tasks

Όχι ως υποκατάστατο επιστημονικής σκέψης.

EBM & SR

Μετάβαση στη Meta-analysis

Τώρα που μάθαμε πώς επιλέγουμε μελέτες...
πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματά τους
ποσοτικά;

EBM & SR

Take-home Messages

- Οι systematic reviews μειώνουν το bias
- Η ποιότητα της αναζήτησης είναι κρίσιμη
- Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη
- Η AI βοηθά αλλά δεν αντικαθιστά τον ερευνητή

EBM & SR